



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
SaludMadrid Servicio de Farmacia

 **Comunidad de Madrid**



OCREVUS 300 MG CONCENTRADO SOL. 1 VIAL 10 ML

ROCHE FARMA, S. A.

Evaluable y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: OCRELIZUMAB

GRUPO TERAPÉUTICO: L04AA36 – Agente inmunosupresor selectivo

Presentación en viales, cada vial contiene 300 mg de ocrelizumab en 10 ml perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
 - Nombre de principio activo
 - Dosis en miligramos
 - Vía de administración
 - Lote
 - Caducidad
 - Código Nacional
 - Laboratorio preparador
-
- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.

- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

Ocrelizumab tiene dos indicaciones autorizadas por Ficha Técnica:

- Tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) temprana en referencia a la duración de la enfermedad y al nivel de discapacidad, y que presenten actividad inflamatoria en las pruebas de imagen.
- Tratamiento de pacientes adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple (EMR) con enfermedad activa definida por características clínicas o de imagen.

Informe de Posicionamiento Terapéutico de ocrelizumab en Esclerosis Múltiple (año 2019): posiciona ocrelizumab como alternativa a otros fármacos de segunda línea en EMR. Además, podría considerarse como alternativa de primera línea en pacientes con enfermedad de curso rápido y agresivo, y/o con factores de mal pronóstico.

Se adjunta bibliografía



Fdo Ana María Álvarez Díaz
Responsable del Servicio de Farmacia