



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Servicio de Farmacia



STELARA 45 MG. JERING. PREC 0,5 ML C/1

JANSSEN-CILAG, S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: USTEKINUMAB

Evaluable y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: L04AC05 - Inmunosupresores, inhibidores de la interleucina

Presentación en jeringas precargadas, perfectamente identificadas con:

- Nombre comercial
 - Nombre de principios activos
 - Dosis en miligramos
 - Vía de administración
 - Lote
 - Caducidad
 - Código Nacional
 - Laboratorio preparador
-
- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SaludMadrid

Servicio de Farmacia



Comunidad de Madrid

- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.


La guía ESPOGUIA de la sociedad española de reumatología, actualización de 2018, recomienda la utilización de ustekinumab, como el tratamiento farmacológico de elección para los pacientes con Artritis Psoriásica y respuesta inadecuada a FAME, especialmente en aquellos casos con afectación cutánea grave.

Las guías NICE recomiendan el uso de ustekinumab en psoriasis cuando la enfermedad es grave, según la puntuación del Índice de Gravedad del Área de Psoriasis (PASI), o bien si el paciente no ha respondido a las terapias de primera línea como ciclosporina, metotrexato o PUVA (o estos tratamientos están contraindicados).

Las guías NICE recomiendan el uso de ustekinumab en E. Crohn cuando la enfermedad es moderada-grave y no ha respondido a tratamiento previo con terapia convencional o anti-TNF.

Las guías de la American Gastroenterological Association (AGA) recomienda el uso de ustekinumab en colitis ulcerosa moderada-grave que no ha respondido a terapia previa convencional o anti-TNF

Se adjunta bibliografía.



Fdo Ana Álvarez Díaz
Jefe de Servicio de Farmacia



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Servicio de Farmacia



Comunidad de Madrid



STELARA 90 MG. JERING. PREC 0,5 ML C/1

JANSSEN-CILAG, S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: USTEKINUMAB

Evaluado y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: L04AC05 - Inmunosupresores, inhibidores de la interleucina

Presentación en jeringas precargadas, perfectamente identificadas con:

- Nombre comercial
- Nombre de principios activos
- Dosis en miligramos
- Vía de administración
- Lote
- Caducidad
- Código Nacional
- Laboratorio preparador

- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.

- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

La guía ESPOGUIA de la sociedad española de reumatología, actualización de 2018, recomienda la utilización de ustekinumab, como el tratamiento farmacológico de elección para los pacientes con Artritis Psoriásica y respuesta inadecuada a FAME, especialmente en aquellos casos con afectación cutánea grave.

Las guías NICE recomiendan el uso de ustekinumab en psoriasis cuando la enfermedad es grave, según la puntuación del Índice de Gravedad del Área de Psoriasis (PASI), o bien si el paciente no ha respondido a las terapias de primera línea como ciclosporina, metotrexato o PUVA (o estos tratamientos están contraindicados).

Las guías NICE recomiendan el uso de ustekinumab en E. Crohn cuando la enfermedad es moderada-grave y no ha respondido a tratamiento previo con terapia convencional o anti-TNF.

Las guías de la American Gastroenterological Association (AGA) recomienda el uso de ustekinumab en colitis ulcerosa moderada-grave que no ha respondido a terapia previa convencional o anti-TNF

Se adjunta bibliografía.



Fdo Ana Álvarez Díaz
Jefe de Servicio de Farmacia



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Servicio de Farmacia



STELARA 130 MG. VIALES 26 ML C/1

JANSSEN-CILAG, S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: USTEKINUMAB

Evaluado y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: L04AC05 - Inmunosupresores, inhibidores de la interleucina

Presentación en jeringas precargadas, perfectamente identificadas con:

- Nombre comercial
 - Nombre de principios activos
 - Dosis en miligramos
 - Vía de administración
 - Lote
 - Caducidad
 - Código Nacional
 - Laboratorio preparador
-
- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.



- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.


La guía ESPOGUIA de la sociedad española de reumatología, actualización de 2018, recomienda la utilización de ustekinumab, como el tratamiento farmacológico de elección para los pacientes con Artritis Psoriásica y respuesta inadecuada a FAME, especialmente en aquellos casos con afectación cutánea grave.

Las guías NICE recomiendan el uso de ustekinumab en psoriasis cuando la enfermedad es grave, según la puntuación del Índice de Gravedad del Área de Psoriasis (PASI), o bien si el paciente no ha respondido a las terapias de primera línea como ciclosporina, metotrexato o PUVA (o estos tratamientos están contraindicados).

Las guías NICE recomiendan el uso de ustekinumab en E. Crohn cuando la enfermedad es moderada-grave y no ha respondido a tratamiento previo con terapia convencional o anti-TNF.

Las guías de la American Gastroenterological Association (AGA) recomienda el uso de ustekinumab en colitis ulcerosa moderada-grave que no ha respondido a terapia previa convencional o anti-TNF

Se adjunta bibliografía.



Fdo Ana Álvarez Díaz
Jefe de Servicio de Farmacia