



LILLY, S.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: RAMUCIRUMAB (CYRAMZA®) 100 MG/10 ML Y 500 MG/50 ML VIAL C/1

Evaluable y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: L01XC21 (agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales).

Presentación en viales, perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
- Nombre de principio activo
- Dosis en miligramos
- Vía de administración
- Lote
- Caducidad
- Código Nacional
- Laboratorio preparador

▪ Información técnica complementaria relativa a:

- Posología y forma de administración
- Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
- Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
- Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual. Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

La guía clínica de hepatocarcinoma del National Comprehensive Cancer Network (NCCN) versión 5.2020, recomienda ramucirumab (con recomendación de primer grado) en el tratamiento del hepatocarcinoma tras progresión a la primera línea de tratamiento sistémico.

La guía clínica de cáncer gástrico del NCCN versión 3.2020, recomienda ramucirumab (en monoterapia o asociado a paclitaxel) con recomendación de primer grado en el tratamiento en segunda línea del cáncer gástrico irresecable localmente avanzado o metastásico. También incluye con categoría 2B (útil en ciertas circunstancias) la combinación de ramucirumab con fluorouracilo e irinotecán en dicha patología.

La guía clínica de cáncer de colon del NCCN versión 4.2020 y la guía clínica de cáncer rectal del NCCN versión 6.2020, recomiendan ramucirumab en combinación con quimioterapia convencional (esquema FOLFIRI o irinotecán) en el tratamiento en segunda línea o sucesiva del cáncer colorrectal avanzado o metastásico.

La guía (Sociedad Europea de Oncología Médica) ESMO corroboran las indicaciones de las guías NICE y además añaden la siguiente indicación; en combinación con docetaxel en pacientes adultos localmente avanzado o metastásico de cáncer de células de pulmón no microcitico que haya progresado a la quimioterapia basada en platino.

Se adjunta bibliografía.

Madrid, a 16 de marzo de 2023


DRA. ANA ALVAREZ DÍAZ
JEFA DEL SERVICIO DE FARMACIA