



SERVIER, S.L.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: TRIFLURIDINA
TIPIRACILO (LONSURF®) 15/6,14 MG, 20/8.19 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELÍCULA C/30 Y C/20.**

Incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: L01BC59 agentes antineoplásicos, antimetabolitos.

Presentación en comprimidos perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
 - Nombre de principio activo
 - Dosis en miligramos
 - Vía de administración
 - Lote
 - Caducidad
 - Código Nacional
 - Laboratorio preparador
-
- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración.
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartón y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.



Acorde al **informe de posicionamiento terapéutico** de la SEOM recomienda trifluridina tipiracilo en cáncer gástrico o adenocarcinoma de la UEG metastásicos con al menos dos líneas previas.

Así mismo en las guías Sociedad Europea de Oncología Médica (**ESMO**), también se incluyó la de personas con cáncer gástrico o colonrectal metastásico (CCRm) que hayan sido previamente tratados o no se les considere candidatos al tratamiento con terapias disponibles, incluidas quimioterapia basada en fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecán, agentes anti-VEGF y agentes anti-EGFRdiferenciado de tiroides (CDT) refractario al yodo radioactivo (RI).

Se adjunta bibliografía.

Madrid, a 10 de mayo de 2023


DRA. ANA ALVAREZ DIAZ
JEFA DEL SERVICIO DE FARMACIA