



- ECOG 0-1
- No se consideran candidatos al tratamiento:
 - Pacientes con infección por VIH con carga viral detectable
 - Pacientes con infección por hepatitis B o C con carga viral detectable
 - Pacientes que hayan recibido una terapia CAR previa
- pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG), linfoma de células B de alto grado (LCBAG), linfoma B primario mediastínico de células grandes (LBPM) y linfoma folicular de grado 3B (LF3B) que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a la misma. Los pacientes candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:
 - Edad: ≥ 18 años
 - Diagnóstico histológico confirmado de LBDCG ó LCBAG ó LBPM ó LF3B
 - Enfermedad refractaria o en recaída en los 12 meses después de haber completado inmuoquimioterapia de primera línea
 - Haber recibido un anticuerpo monoclonal anti-CD20 (salvo que el tumor sea CD20 negativo) y un régimen de quimioterapia con antraciclinas
 - ECOG 0-1
- No se consideran candidatos al tratamiento:
 - Pacientes con infección por VIH con carga viral detectable
 - Pacientes con infección por hepatitis B o C con carga viral detectable
 - Pacientes que hayan recibido una terapia CAR previa

El informe de posicionamiento terapéutico del fármaco elaborado por la Agencia Española del Medicamento está disponible en el siguiente enlace:
https://www.google.com/search?q=POSICIONAMIENTO+BREYANCI&rlz=1C1GCFA_enES1130ES1130&oq=POSICIONAMIENTO+BREYANCI&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCDY1ODNqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

MADRID, a 23 de marzo 2026


DRA. ANA ÁLVAREZ DÍAZ
JEFA DEL SERVICIO DE FARMACIA